

「賽安勃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 7 月 13 日農授防字第 1121489048A 號公告修正

10.26%(w/w) 賽安勃 水分散性油懸劑 (OD)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜菜類	粉蝨類	0.625公升	800	平均每葉成蟲數達1隻以上1週後開始施藥。	7	連續2次	藥液量500公升/公頃，藥劑量0.625公升/公頃。	4	避免於開花期使用。	
瓜果類	粉蝨類	0.625公升	800	平均每葉成蟲數達1隻以上1週後開始施藥。	7	連續2次	藥液量500公升/公頃，藥劑量0.625公升/公頃。	4	避免於開花期使用。	
十字花科包葉菜類	粉蝨類	0.625公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		7		本項新增。
番茄	粉蝨類	0.625公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		3		本項新增。
甜椒										本項新增。
茄子										本項新增。
辣椒										本項新增。
枸杞										本項新增。
香瓜茄										本項新增。
樹番茄										本項新增。

10.2%(w/w) 賽安勃 濃懸乳劑 (SE)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
椪果	螟蛾類	0.5 公升	3,000	新梢抽出後開始施藥。	15	連續 2 次		21	避免於開花期使用影響授粉昆蟲。	
山茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
山茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
茶	捲葉蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	