

「賽洛安勃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 7 月 13 日農授防字第 1121489046A 號公告修正

150 g/L (15% w/v) 賽洛安勃 膠囊水懸混劑 (ZC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	鱗翅目害蟲	0.2-0.4公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		
十字花科包葉菜類	金花蟲類	0.2-0.4公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		
結球萵苣	鱗翅目害蟲	0.2-0.4公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		
蔥科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.25-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		9		
蔥	夜蛾類	0.25-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7				採收前 9 天 (設施栽培 15 天) 停止施藥。	
茄科果菜類	鱗翅目害蟲	0.2-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		
茄科果菜類	植食性瓢蟲類	0.2-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		
金針	鱗翅目害蟲	0.2-0.5公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		
錦葵科果菜類	鱗翅目害蟲	0.2-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
花木	夜蛾類	0.2-0.6公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	最多2次			1. 限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。 2. 避免於開花期使用。	
瓜菜類	鱗翅目	0.25- 0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		3		本項新增。
	害蟲									本項新增。
	金花蟲類									本項新增。
	植食性瓢蟲類									本項新增。