「派滅淨」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 8 月 7 日農授防字第 1121489193A 號公告修正

一、變更安全劑型一覽表

農藥名稱	登記廠商名稱	變更日期	備註
250g/L (25% w/v)派滅淨 SC	萬得發有限公司	112年8月7日	本藥劑係 25%WP 轉換 為更安全劑型。

二、「派滅淨」農藥使用方法與範圍一覽表

50(%) (w/w) 派滅淨 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用 量	稀釋倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
瓜菜類	蚜蟲類	0.2-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6		
胡瓜	棉蚜	0.2-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6		
瓜果類	蚜蟲類	0.2-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6		
草莓	蚜蟲類	0.2-0.5 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		

25(%)(w/w) 派滅淨 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
水稻	褐飛蝨	0.8 公 斤	1,500	害蟲發生 時施藥1次。				10	孕穗期及抽 穗初期特別 注意。	
茭白筍	長綠飛	0.6-0.8 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施藥。	7	2		6		
瓜菜類	粉蝨類	0.8 公 斤	1,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2-3		6		

作物名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥次數	施藥方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
瓜菜類	蚜蟲類	0.5 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施藥。	7	2		6		
胡瓜	棉蚜	0.5 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		6		
豆菜類	粉蝨類	0.5-0.6 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			21	禁止使用於豆苗。	
大豆	銀葉粉	0.5-0.6 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			21	限毛豆使 用。	
瓜果類	粉蝨類	0.8 公 斤	1,200	害蟲發生 時開始施藥。	7	2-3		6		
洋香瓜	銀葉粉	0.8 公 斤	1,200	害蟲發生 時開始施藥。	7	2-3		6		本復登物品項係係。
瓜果類	蚜蟲類	0.5 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施藥。	7	2		6		
草莓	蚜蟲類	0.4-1 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			7		
樣果	葉蟬類	1.0-1.2 公斤	1,500	抽穗及開花期害蟲 發生時開始施藥。				9		
花木	粉蝨類	0.3-0.6 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施藥。	7				限觀賞花卉 使用,使用 前宜先 藥 所面積。 測試。	

作物	产虫	每公頃	稀釋		施藥	施藥	施藥	安全採		
	病蟲 名稱	每次用	· 稀梓 倍數	使用時期	間隔	池架 次數	他樂 方法	收期	注意事項	說明
名稱	石柵	量	信製		(天)	大 数	刀法	(天)		
水稻	褐飛蝨	0.8 公	1,500	害蟲發生				<u>10</u>	孕穂期及	本藥劑係
		<u>升</u>		時施藥1					抽穗初期	25%WP
				<u> 次。</u>					特別注	轉換為更
									意。	安全劑
茭白筍	長綠飛	0.6-0.8	<u>2,000</u>	害蟲發生	<u>7</u>	<u>2</u>		<u>6</u>		型。
	虫虫	公升		時開始施						
				藥。						
瓜菜類	粉蝨類	0.8 公	1,200	害蟲發生	<u>7</u>	<u>2-3</u>		<u>6</u>		
		<u>升</u>		時開始施						
				<u>藥。</u>						
瓜菜類	蚜蟲類		2,000	害蟲發生	<u>7</u>	2		<u>6</u>		
		<u>升</u>		時開始施						
				<u>藥。</u>						
胡瓜	棉蚜	,	<u>2,000</u>	害蟲發生	<u>7</u>	<u>2</u>		<u>6</u>		
		<u>升</u>		時開始施						
				<u>藥。</u>						
豆菜類	粉蝨類		<u>2,000</u>	害蟲發生	<u>7</u>			<u>21</u>	禁止使用	
		<u>公升</u>		時開始施					於豆苗。	
				<u>藥。</u>						
<u>大豆</u>	銀葉粉		<u>2,000</u>	害蟲發生	<u>7</u>			<u>21</u>	限毛豆使	
	虹	公升		時開始施					<u>用。</u>	
4 77 10-	1) 7 1-	0.0.		藥。	_			_		
<u>瓜果類</u>	粉蝨類	0.8 公	<u>1,200</u>	害蟲發生	<u>7</u>	<u>2-3</u>		<u>6</u>		
		<u>升</u>		時開始施						
W f d	to ++ 10	0.0	1.200	藥。	_	2.2				
洋香瓜	銀葉粉	0.8 公	<u>1,200</u>	害蟲發生		<u>2-3</u>		<u>6</u>		
	虹	<u>升</u>		時開始施						
公田 北	1.11 中 北元	0.5.1	2 000	藥。	7	2				
瓜果類	蚜蟲類		2,000	害蟲發生		<u>2</u>		<u>6</u>		
		<u>升</u>		時開始施						
古	九正 电 华石	0.4.1.4	2 000	藥。	7			7		
<u>草莓</u>	<u>蚜蟲類</u>	<u>0.4-1 公</u> 弘	<u>∠,000</u>	害蟲發生				7		
		<u>升</u>		時開始施藥。						
逆 甲	拉 品 彩	1012	1 500		10			0		
檬果	葉蟬類	1.0-1.2 公升	<u>1,500</u>	抽穗及開花期宝忠				9		
		<u>公升</u>		<u>花期害蟲</u>						
				發生時開	<u> </u>					

作物名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				始施藥。						
花木	粉蝨類	0.3-0.6	2,000	害蟲發生	<u>7</u>				限觀賞花	
		公升		時開始施					卉使用,	
				藥。					使用前宜	
									先進行小	
									面積藥害	
									測試。	